

Профилактика COVID-19 при оказании медицинской помощи



Профилактика COVID-19



Специфическая профилактика:
В настоящее время средства специфической профилактики COVID-19 не разработаны



Неспецифическая профилактика:
Неспецифическая профилактика представляет собой мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, и проводится в отношении:



источника инфекции (больной человек)



механизма передачи возбудителя инфекции



потенциально восприимчивого контингента (защита лиц, находящихся и/или находившихся в контакте с больным человеком)



Мероприятия по профилактике у медицинских работников

1

Медицинский персонал, оказывающий помощь пациентам с COVID-19 и при подозрении на данное заболевание должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: шапочки, противочумные халаты, защитные очки или экран, респираторы (класса FFP2 или выше).

2

Медицинский персонал не должен прикасаться к глазам, носу, рту, руками, в том числе в перчатках.

3

Для медицинских работников в функции которых входит сбор и удаление медицинских отходов класса В, необходима защита органов дыхания с помощью респиратора.

4

Следует проводить ежедневные осмотры медицинских работников с проведением термометрии 2 раза в день на протяжении всего периода ухода за пациентами с COVID-19 и в течение 14 дней после последнего контакта с больным.

5

Гигиеническую обработку рук с использованием спиртосодержащих кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного (потенциального больного), его слизистыми оболочками, выделениями, повязками и предметами ухода, а также объектами, находящимися в непосредственной близости от больного.

6

При попадании биологического материала, содержащего возбудитель COVID-19 на слизистые оболочки или кожные покровы:



Руки обрабатывают спиртосодержащим кожным антисептиком или спиртом, если лицо не было защищено, то его протирают тампоном, смоченным 70%-м этиловым спиртом.



Слизистые оболочки рта и горла прополаскивают 70%-м этиловым спиртом, в глаза и нос закапывают 2%-й раствор борной кислоты.



Профилактика распространения в медицинских организациях



Пациент с подозрением или наличием COVID-19



Доставка специализированным транспортом



Госпитализация в инфекционный стационар

Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания.

Включает меры гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки.

Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя.

Транспорт и предметы, использованные при транспортировании, обеззараживаются на территории медицинской организации на специально оборудованной площадке.

В кладовой одежда больного хранится в индивидуальных мешках, сложенных в баки или полиэтиленовые мешки.

Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов, утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, применяемыми к отходам класса В.



Медицинский персонал и водитель, контактирующие с больными COVID-19 (при подозрении на инфекцию) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: шапочки, противочумные халаты, респираторы (класса FFP2 и выше), защитные очки или экран.



Дезинфекционные мероприятия

1

Проводят текущую и заключительную дезинфекцию. Для проведения дезинфекции используют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в отношении вирусных инфекций (например, на основе хлораактивных и кислородактивных соединений).

2

Дезинфекции подлежат все поверхности в помещениях, предметы обстановки, дверные ручки, подоконники, спинки кровати, прикроватные тумбочки, посуда больного и посуда, в которой пища поступила в отделение, остатки пищи, игрушки, воздух, выделения больного, транспорт и другие объекты.

3

Столовую посуду, белье больного и предметы ухода обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

4

Постельные принадлежности после выписки, смерти или перемещения пациента сдаются в дезинфекционную камеру.

5

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием оборудования на основе ультрафиолетового излучения, различных видов фильтров.

6

Воздух в отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей, дезинфицирующих средств.

7

При обработке поверхностей в помещениях применяют способ орошения.

Профилактика COVID-19 при оказании медицинской помощи

Рекомендации для медицинских организаций:



РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИК ВЫХОДА
персонала на рабочее место
малыми группами в целях
исключения скопления людей
в местах входа



НЕ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ
персонал с признаками
респираторного заболевания
(входная термометрия)



ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА
(рециркуляторы воздуха,
УФ-облучатели бактерицидные),
регулярное проветривание
помещений



СОБЛЮЖДЕНИЕ МЕР ГИГИЕНЫ:
частое мытье рук мылом
или протирка их кожным
антисептиком (после любого
контакта с пациентами)



ИСКЛЮЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ
посещение медицинской
организации «здоровым»
контингентом



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



**Пациент с подозрением
или наличием COVID-19**

Профилактическая дезинфекция начинается
немедленно при возникновении угрозы
заболевания.

Включает меры гигиены, частое мытье рук
с мылом или протирку их кожными
антисептиками, регулярное проветривание
помещений, проведение влажной уборки.

Мероприятия прекращаются через 5 дней после
ликвидации угрозы заноса возбудителя.



**Доставка
специализированным
транспортом**

Транспорт и предметы, использованные
при транспортировании, обеззараживаются
на территории медицинской организации
на специально оборудованной площадке.



**Медицинский персонал и водитель,
контактирующие с больными COVID-19**
(при подозрении на инфекцию) должны быть
обеспечены средствами индивидуальной защиты:
шапочки, противочумные халаты, респираторы
(класса FFP2 и выше), защитные очки или экран.



**Госпитализация
в инфекционный
стационар**

В кладовой одежда больного хранится
в индивидуальных мешках, сложенных в баки
или полиэтиленовые мешки.

Медицинские отходы, в том числе биологические
выделения пациентов, утилизируются
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, применяемыми к отходам класса В.

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Для проведения дезинфекции используют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в отношении **вирусных инфекций** (например, на основе **хлораактивных и кислородактивных** соединений)




Дезинфекции подлежат **все поверхности** в помещениях, предметы обстановки, дверные ручки, подоконники, спинки кровати, прикроватные тумбочки, посуда больного и посуда, в которой пища поступила в отделение, остатки пищи, игрушки, воздух, транспорт и другие объекты



Столовую посуду, белье больного и предметы ухода обрабатывают способом **погружения** в растворы дезинфицирующих средств. Постельные принадлежности после выписки, смерти или перемещения пациента сдаются в **дезинфекционную камеру**



Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием оборудования на основе **ультрафиолетового излучения**, различных видов фильтров



Воздух в отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием **открытых ультрафиолетовых облучателей**, аэрозолей, дезинфицирующих средств



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ ЭПИДЕМИИ COVID-19

1

I этап снятия ограничений

Диспансеризация не проводится.



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

2

II и III этап снятия ограничений

Возобновляется проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения. Не рекомендуется на данном этапе проходить осмотр лицам в возрасте 65 лет и старше, а также лицам из группы риска, имеющим хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

3

Снятие всех ограничений

Возобновляется диспансеризация для всех категорий граждан без ограничений.

Как пройти диспансеризацию?



Предварительно запишитесь по телефону или через сайт Госуслуг.



За один день до посещения медицинской организации Вам позвонят с целью подтверждения визита.



Вам зададут несколько вопросов для выявления рисков заражения новой коронационной инфекцией.

В медицинской организации:



Обязательно носить маску



При входе Вам будет измерена температура бесконтактным методом



Необходимо соблюдать принцип социальной дистанции в 1,5 метра



Осуществляется проветривание в помещениях, а также дезинфекция



Организовано разделение потоков пациентов и строгое выполнение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий



Проводится еженедельное обследование на коронавирусную инфекцию для медицинских работников.

Общие принципы снятия режима ограничений в связи эпидемией COVID-19

01

Учет трех параметров:

О ходе и сроках снятия ограничительных мер губернаторы принимают решение самостоятельно по согласованию с главными санитарными врачами регионов



Коэффициент распространения инфекции в регионе

Свободный коечный фонд

Охват тестированием

**ВИРУС,
КОТОРЫЙ
МЫ
ПОБЕДИМ
ВМЕСТЕ!**

СТ  **КОРОНАВИРУС.РФ**

02

Три этапа снятия ограничений:

1

Доступны:

- прогулки
- занятия спортом на улице

Возобновляется работа:

- небольших объектов непродовольственной торговли и услуг (исключение контакта большого числа людей одновременно)
- предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями

2

Возобновляется работа:

- предприятий торговли большей площади с сохранением ограничения количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале
- отдельных образовательных организаций

3

Возобновляется работа:

- предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей и площади объекта
- предприятий общественного питания
- гостиниц
- образовательных учреждений без исключения

03

Обязательные правила для населения и предприятий на всех этапах:



Режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания:

- старше 65,
- с хроническими заболеваниями (в первую очередь – люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом)



- Дополнительные меры предосторожности при вынужденном выходе из дома
- Работа в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия
- Введение, где возможно, посменной работы (с нахождением на дистанционной работе людей из групп риска)



Соблюдение дезинфекционного режима и соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров)



Соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и в организациях

Использование гигиенических масок:

- в транспорте,
- в общественных местах,
- при любом выходе на улицу



РОСПОТРЕБНАДЗОР